

SANTÉ CANADA A ACCORDÉ UNE EXCEPTION TEMPORAIRE À L'IMPORTATION D'UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE SUSPENSIONS D'ACÉTAMINOPHÈNE TYLENOL® POUR ENFANTS. SERVEZ-VOUS POUR AVOIR LA VERSION FRANÇAISE DE L'EMBALLAGE DE CES PRODUITS IMPORTÉS.

TYLENOL® pour enfants de 2 à 11 ans, Raisin



NDC 50580-612-01

Ingrédients inactifs

acide citrique anhydre, AD&C bleu n° 1, arômes, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose microcristalline, D&C rouge n° 33, eau purifiée, glycérine, gomme de xanthane, sirop de maïs à haute teneur en fructose, solution de sorbitol, sucralose

TYLENOL® pour enfants de 2 à 11 ans, Cerise, sans colorant



NDC 50580-170-01

Ingrédients inactifs

acide citrique anhydre, arômes, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose microcristalline, eau purifiée, glycérine, gomme de xanthane, saccharose, solution de sorbitol, sorbate de potassium, sucralose

TYLENOL® pour enfants

- Les pédiatres recommandent TYLENOL® pour la douleur et la fièvre
- Les mamans y font confiance depuis plus de 60 ans

MODE D'EMPLOI :

ÉTAPE 1.

Bien agiter avant l'emploi

ÉTAPE 2.

Retirer le bouchon sécurité-enfants

ÉTAPE 3.

Presser pour verser la dose appropriée dans le gobelet doseur

IMPORTANT :

Consulter le tableau posologique ou un médecin pour connaître la dose exacte pour votre enfant

Info-médicament

| Ingrédient actif (par dose de 5 ml) | Utilité |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Acétaminophène 160 mg | Analgésique/antipyrétique |

Usages Agit temporairement pour :

- réduire la fièvre
- soulager les douleurs et courbatures mineures dues :
 - au rhume
 - à la grippe
 - au mal de tête
- au mal de gorge
- au mal de dents

Mises en garde

Avertissement – foie : Ce produit contient de l'acétaminophène.

- Des lésions graves au foie peuvent survenir si votre enfant
- prend plus de 5 doses en 24 heures, soit la dose quotidienne maximale
 - prend ce médicament avec d'autres médicaments à base d'acétaminophène

Alerte aux allergies : l'acétaminophène peut causer des réactions cutanées graves, dont les symptômes peuvent inclure :

- rougeur de la peau
- ampoules
- éruption cutanée

En cas de réaction cutanée, cesser l'emploi et obtenir des soins médicaux immédiatement.

Avertissement – maux de gorge : si le mal de gorge est intense, s'il dure plus de 2 jours ou s'il est accompagné ou suivi d'autres symptômes, tels que : fièvre, mal de tête, éruption cutanée, nausées ou vomissements, consulter immédiatement un médecin.

Ne pas utiliser

- avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène (sur ordonnance ou en vente libre). Si vous ne savez pas si un médicament contient de l'acétaminophène, posez la question à un médecin ou un pharmacien.
- si l'enfant est allergique à l'acétaminophène ou à tout ingrédient inactif de ce produit

Consultez un médecin avant l'utilisation si votre enfant souffre d'une maladie du foie

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si votre enfant prend de la warfarine (un anticoagulant)

Ne pas dépasser la dose recommandée (voir l'avertissement sur le surdosage)

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si

- la douleur s'aggrave ou dure plus de 5 jours
- la fièvre s'aggrave ou dure plus de 3 jours
- de nouveaux symptômes apparaissent
- une rougeur ou une enflure apparaissent

Ces symptômes pourraient être le signe d'une affection grave.

Garder hors de la portée des enfants.

Surdosage : En cas de surdosage, obtenir des soins médicaux ou contacter un centre antipoison immédiatement.

Il est essentiel d'obtenir immédiatement des soins médicaux pour les adultes et les enfants, même en l'absence de signes ou symptômes.

Mode d'emploi

- ce produit ne comporte pas de mode d'emploi ni de mises en garde complètes pour un emploi chez les adultes.
- ne pas dépasser la dose recommandée (voir l'avertissement sur le surdosage)
- bien agiter avant l'emploi
- ml = millilitre
- se servir du tableau ci-après pour trouver la bonne dose. Si possible, établir la dose en fonction du poids, sinon de l'âge.
- retirer le bouchon sécurité-enfants et presser le flacon pour déposer la bonne dose dans le gobelet
- répéter la dose toutes les 4 heures tant que les symptômes persistent
- ne pas administrer plus de 5 doses en 24 heures

| Poids (lb) | Poids (kg) | Âge (ans) | Dose (ml)* |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| moins de 24 | moins de 11 | moins de 2 ans | demandez à un médecin |
| 24-35 lb | 11-15,9 kg | 2-3 ans | 5 ml |
| 36-47 lb | 16-21,9 kg | 4-5 ans | 7,5 ml |
| 48-59 lb | 22-26,9 kg | 6-8 ans | 10 ml |
| 60-71 lb | 27-31,9 kg | 9-10 ans | 12,5 ml |
| 72-95 lb | 32-43,9 kg | 11 ans | 15 ml |

* ou selon les directives d'un médecin

Attention : Se servir uniquement du gobelet doseur ci-inclus qui a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec ce produit. Ne pas utiliser d'autres dispositifs doseurs.

Autres renseignements

- chaque dose de 5 ml contient :
 - 5 mg de potassium (NDC 50580-170-01 - CERISE)
 - 2 mg de sodium (NDC 50580-612-01 - RAISIN)
- conserver entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F)
- ne pas utiliser si la boîte est ouverte. Ne pas utiliser si le sceau du flacon portant la mention « TYLENOL » est manquant ou est brisé

Questions ou commentaires? Composer le 1 800 265-7323

Distribué par :
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.
 McNeil Consumer Healthcare Division
 © Johnson & Johnson Inc. 2022

Fort Washington, PA 19034 USA
 Visitez-nous au www.tylenol.com